EC FERTILIZER

# LION

## NPK GÜBRESİ HARMANLANMIŞ

## LİON
## 18-18-18+ME

| GARANTİ EDİLEN İÇERİĞİ | (W/W) |
|---|---|
| Toplam Azot (N) | % 18 |
| Amonyum Azotu (N) | % 3,5 |
| Üre Azotu (N) | % 14,5 |
| Nötral Amonyum Sitrat ve Suda Çözünür Fosforpenta Oksit ($P_2O_5$) | % 18 |
| Suda Çözünür Fosforpenta Oksit ($P_2O_5$) | % 18 |
| Suda Çözünür Potasyum Oksit ($K_2O$) | % 18 |
| Suda Çözünür Bor (B) | % 0,01 |
| Suda Çözünür Bakır (Cu) (Tamamı EDTA ile Şelatlı) | % 0,01 |
| Suda Çözünür Demir (Fe) (Tamamı EDTA ile Şelatlı) | % 0,04 |
| Suda Çözünür Mangan (Mn) (Tamamı EDTA ile Şelatlı) | % 0,01 |
| Suda Çözünür Çinko (Zn) (Tamamı EDTA ile Şelatlı) | % 0,03 |

**EDTA Şelatının Stabil Olduğu pH Aralıkları (Cu, Fe ve Mn)için 3-8, (Zn) için 2-9**

LION

LION

EC FERTILIZER

LION

## NPK GÜBRESİ HARMANLANMIŞ

**WARNING**

Keep out of reach of children
Do not contact with eyes and/or skin immedoately flush with plenty of Water and seek medical attention.
Use the optimum dozage .Avoid large doses.
Wash hands after use.
Do not use empty package for any purposes.
Destroy the empty package after use.
When handling this product, wear suitable gloves, eye protection and Protective clothing and mask.
Do not mix with high alkali and acids,clor,organic phosphorus, Alluminium and sulphur.

**USAGE RATES:**

Must be used in deficiency of Nitrogen, Phosphorus and Potassium 2 or 3 times as folliar or by dripping.
For foliar application, dosage for 100 liters water;
Vegetables: 200-250 g
Grapesand Fruits: 200-300 g
For dripping according to need and period of plant, 0.5-1 kg per 1000 m²

**UYARILAR**

*Kullanım talimatı ve depolama şartlarına her durumda uyunuz. * Ürünü satın Aldığınız yerden mutlaka ürünün güvenlik ve uygulama kurallarına dair bilgi İsteyiniz. *Dikkat çocuklardan uzak tutunuz. *Göz, yüz ve deri ile temas Ettirmeyiniz. *Önerilen dozajı aşmayın. *Kullanımdan sonra ellerinizi bol su İle yıkayınız. *Kullanılmış olan boş ambalajları başka amaçla kullanmayınız. *Kullandıktan sonra ambalajları imha ediniz. *Kullanırken mutlaka uygun Maske, gözlük ve koruyucu elbise giyiniz. *Toprak ve/veya yaprak analizi Yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.

**DEPOLAMA**

Ürünü serin, kuru ve havalandırma sistemi olan bir yerde muhafaza ediniz. Ürünü direkt güneş ışığına maruz bırakmayınız. Depolarda sigara içmeyiniz. Ateşle yaklaşmayınız, patlayıcı alev alan maddeler ve diğer kimyasallardan uzak tutunuz. Ürünü depolarda ve kapalı alanlarda kullanım için ambalajından açmayınız. Sürekli havalanması olan bir yerde açık alanlarda açıp, kullanıma hazırlayınız. Kapalı ortamlarda ve aksi belirtilmedikçe başka kimyasallarla karıştırmayınız. Depolarda ve uygulama sırasında uygun maske kullanınız. Depolama sıcaklığı: 0+45 ºC (derece) arası olmalıdır.

**KULLANIM SIRASINDA TEKNİK TALİMATLAR**

Kullanmadan önce etiket bilgilerini tamamen okuyunuz. Kuvvetli alkali (yüksek pH) ve kuvvetli asitlerle (düşük pH), klor, organik fosfor, alüminyum içeren kimyasallarla ve aktif kükürt içeren bileşiklerle karıştırmayınız. Kullanım sırasında mutlaka önce su sonra ürünü karışıma hazırlayınız. Kullanmadan önce maske takınız ve kullanmaya başlayınız, kullanım sırasında uygulama bölgesine girerken tüm koruyucu önlemlere dikkat ediniz (eldiven, gözlük). Uygulama sırasında özellikle çocuklar ve korunma önlemi almamış diğer şahıs ve tüm canlıları uzak tutunuz. Tavsiye edilenin dışında başka kimyasallarla karışım yapma ihtiyacı doğmuşsa, mutlaka ya üretici firmayla veya ürünü satın aldığınız bayi ile temasa geçerek sorunuz. Üretici firma veya bayi ile temas kuramadığınız durumlarda; şeffaf bir kap içerisine 100 g Su koyunuz, içerisine 1 ya da 2 g üründen koyup çözünüz. Daha sonra karıştırmak istediğiniz malzemeden 1 ya da 2 g ekleyiniz. Eğer çökme, suda çözünmeyen malzemelerin oluşumu, kesilme ve gaz çıkışı veya bunlardan herhangi biri gözlemlenirse karışımı yapmayınız. Bu uygulamayı mutlaka açık alanda ve belirtilen koruyucu önlemler alındıktan sonra yapınız.

**FİRMA BEYANI**

Orjinal ambalajlarında satılmak kaydı ile, imalatçı firma ürünün kalitesini garanti eder. İmalatçı firma ürünün hatalı depolanması veya tavsiyelere uymadaki eksiklikler sonucunda meydana gelebilecek zararlar için sorumluluk kabul etmez. Ürünün spefikasyonuna uygunluğu sadece ürünün fabrika çıkışı sırasında garanti altındadır.

**LİSANS NO** : 422
**TESCİL NO** :
**PARTİ/SERİ NO** :
**ÜRETİM TARİHİ** :
**SON KULLANMA TARİHİ** : Üretim Tarihinden İtibaren 3 Yıldır.
**NET AĞIRLIK** : 0,25 -0,50- 1 –2- 2,5-3- 4- 5- 10- 15- 20- 25 -30-50 kg

**STORAGE AND DISPOSAL**

Keep in a cool, dry and ventilable location.
Store out of direct sunlight.
Do not smoke at store.
Keep away of fire explosive materials, and other chemicals.
Do not open package if the store is not weel ventilable.
Storage temperature must be 0-45˚c (celcius)

**NOTICE OF WARRANTY**

The product is under warranty of the firm only if it is selled by its original package. The product is out of warranty and the producer is not responsible for all damage if it is stored out of cautions or used out of recommantation.

**KULLANIMI**

Azot potasyum veya Fosfor eksikliği görülen bitkilerde en az 2-3 defa yapraktan, tarla bitkileri hariç tüm bitkilerde topraktan uygulanmalıdır. Yapraktan uygulamalar 100 L su için aşağıdaki çizelgede belirtilmiştir. Topraktan yapılan uygulamalarda ihtiyaç ve döneme göre 1 dekara 1-2 kg. gelecek şekilde sulama sisteminden toprağa tatbik edilir.
Not: Asla uygun doz oranını aşmayınız, sadece gerekli yerlerde kullanınız.

KULLANILDIĞI BİTKİLER UYGULAMA ZAMANI ve MİKTARI

| BİTKİ | UYGULAMA ZAMANI | UYGULAMA ŞEKLİ YAPRAKTAN (g/100 L su) | UYGULAMA ŞEKLİ TOPRAKTAN (kg/da) |
|---|---|---|---|
| Sera ve Açık Tarla sebzelerinde,Kavun, Karpuz,Çilek vb. | Bitkilerin 4-5 yapraklı döneminden hasada kadar 4-5 kez | 100 - 200 | 1 - 3 |
| Elma,Armut,Ayva,Şeftali,Kiraz Vişne,Kayısı,Nektarin,Erik vb. | Meyve tutumundan itibaren 20 gün ara ile 3-4 kez uygulanır | 200 - 300 | 1 - 3 |
| Üzüm,Muz,Nar,İncir,Narenciye,Zeytin,Çay vb. | Çiçeklenmeden sonra 20 gün ara ile 3-4 kez uygulanır | 200 - 300 | 1 - 3 |
| Fındık,Ceviz,Antep Fıstığı,Kestane vb. | Meyve tutumundan itibaren 20 gün ara ile 3-4 kez uygulanır | 200 - 300 | 1 - 3 |
| Lahana,Turp,Havuç,Kereviz,Karnabahar vb. | Bitkilerin 4-5 yapraklı döneminden hasada kadar 1-2 kez uygulanır | 200 - 300 | 1 - 3 |
| Soğan,Sarımsak vb. | Yumru oluşumundan itibaren hasada kadar 1-2 kez uygulanır | 200 - 300 | 1 - 3 |
| Şeker Pancarı,Patates,Çeltik vb. | Yumru oluşumundan itibaren hasada kadar 1-2 kez uygulanır | 200 - 300 | - |
| Kesme Çiçekçilik | Gelişme döneminde 30 gün ara ile 2-3 kez uygulanır | 200 - 300 | 1 - 3 |
| Pamuk,Mısır,Ayçiçeği,Soya,Kanola,Tahıllar (buğday,Arpa,Yulaf,Çavdar vb),Baklagiller,Yem Bitkileri vb.) | Bitkilerin 4-5 yapraklı döneminden hasada kadar 1-2 kez uygulanır | 200 - 300 | - |
| Yeşil Alanlar | İhtiyaç duyuldukça 2-3 kez uygulanır | 200 - 300 | - |

USING ON THE PLANTS APPLICATION TIME and DOSAGE

| PLANT | APPLICATION TIME | APPLICATION METHOD From The Foliage (g/100 L water) | APPLICATION METHOD From The Soil (kg/da) |
|---|---|---|---|
| Greenhouse and Open Field Vegetables; Melon, Watermelon, Strawberry etc. | Apply 4-5 times begennig at the period of plants having 4-5 leaveas until harvest | 100 - 200 | 1 - 3 |
| Apple, Pear, Quince, Peach, Cherry, Sour, Cherry, Apricot, Nectarin etc. | Apply 3-4 times beginning at the fruit set at 20 day intervals. | 200 - 300 | 1 - 3 |
| Grape, Banana, Pomegranate, Fig, Citrus, Olive, Tea etc. | Apply 3-4 times at the post-bloom at 20 days intervals. | 200 - 300 | 1 - 3 |
| Hazelnut, Walnut, Pistachio, Chestnut etc. | Apply 3-4 times beginning at the fruit set a 20 days intervals. | 200 - 300 | 1 - 3 |
| Cabbage, Radish, Carrot, Celery, Cauliflower | Apply 1-2 times beginnig at the period of plants having 4-5 leaveas until harvest | 200 - 300 | 1 - 3 |
| Onion, Garlic etc. | Apply 1-2 times beginnig at the tuber formation until harvest | 200 - 300 | 1 - 3 |
| Sugar beet, Potatoes, Paddy Rice | Apply 1-2 times beginng at the tuber formation until harvest | 200 - 300 | - |
| Cut Flowers | Apply 2-3 times at the development periods of the plants | 200 - 300 | 1 - 3 |
| Cotton, Corn, Sunflower, Soybean, Canola, Grains (Wheat, Barley, Oat, Rye etc), Pulse, Forage Crops etc. | Apply 1-2 times beginning at the period of plants having 4-5 leaveas until harvest | 200 - 300 | - |
| Green Areas | Apply 2-3 times as needed. | 200 - 300 | - |

Son kullanma tarihi üretim tarihinden itibaren 3 yıldır.
Expiring Date is 3 years after production.

**ÜRETİCİ FİRMA**
**ODAK TARIM LTD. ŞTİ.**
ANTALYA O.S.B 1.KISIM 10. CADDE
NO:2 DÖŞEMEALTI / ANTALYA
TEL: 0 242 322 01 88 • *www.odaktarim.com*

**TAAHHÜT:Piyasaya sunacağımız ürünün içeriği etiket bilgileri ile tescil belgesindeki değerlerin aynısı olacağını taahhüt eder, aksinin ispatı halinde 7223 sayılı kanuna göre, hakkımızda yapılacak cezai işlemleri kabul ederiz.***