

EC FERTILIZER

METEOR



NPK GÜBRESİ HARMANLANMIŞ

METEOR

16-8-24 + ME

Garanti Edilen İçerik

Toplam Azot (N) 16
Nitrat Azotu (NO₃-N) 8,7
Amonyum Azotu (NH₄-N) 7,3
Nötral Amonyum Sıtrat'ta ve Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P₂O₅) 8
Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P₂O₅) 24
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K₂O) 8
Suda Çözünür Bor (B) 0,01
Suda Çözünür Demir (Fe) 0,03
Suda Çözünür Mangan (Mn) 0,03
Suda Çözünür Çinko (Zn) 0,03

%W/W

16
8,7
7,3
8
24
8
0,01
0,03
0,03
0,03



METEOR

KULLANILDIĞI BİTKİLER UYGULAMA ZAMANI ve NIKTASI	BITKİ	UYGULAMA ZAMANI	UYGULAMA ŞEKLİ (g/100 L water)	PLANT	APPLICATION TIME	APPLICATION METHOD (From the foliage / From the soil /g/100 L water)
KULLANILDIĞI BİTKİLER UYGULAMA ZAMANI ve NIKTASI	Sera ve Açık Tarla sebzelerinde,Kavun, Karpuz,Çilek vb.	Bikilerin 4-5 yaşraklı döneminden hasada kadar 4-5 kez	100- 200	1- 3	Apply 4-5 times beginning at the period of plants having 4-5 leaves until harvest	100- 200
	Elma,Armud,Ayva,Şeftali,Kiraz Ağaç,Kayısı,Nektarin,Erik vb.	Maye tutumundan itibaren 20 gün ara ile 3-4 kez uygulanır	200- 300	1- 3	Apply 3-4 times beginning at the fruit set at 20 days intervals.	200- 300
	Üzüm,Muz,Narince,Narancısı,Zeytin,Çay vb.	Çiçeklenmeden some 20 gün ara ile 3-4 kez uygulanır	200- 300	1- 3	Apply 3-4 times beginning at the fruit set at 20 days intervals.	200- 300
	Tahıl,Çaviz,Anirop,Fıstığı,Kestane vb.	Maye tutumundan itibaren 20 gün ara ile 3-4 kez uygulanır	200- 300	1- 3	Apply 3-4 times beginning at the fruit set at 20 days intervals.	200- 300
	Lahana,Turp,Havuç,Kereviz,Karnabahar vb.	Bikilerin 4-5 yaşraklı döneminden hasada kadar 1-2 kez uygulanır	200- 300	1- 3	Apply 1-2 times beginning at the tuber formation until harvest	200- 300
	Soğan, Sarımsak vb.	Yumu olgusundan itibaren hasada kadar 1-2 kez uygulanır	200- 300	1- 3	Apply 1-2 times beginning at the tuber formation until harvest	200- 300
	Sevker Pancar,Potates,Çilek vb.	Yumu olgusundan itibaren hasada kadar 1-2 kez uygulanır	200- 300	-	Sugar beet, Potatoes, Paddy Rice	200- 300
	Sis Bikileri,Kesme Çiçekçilik	Gelişme döneminde 30 gün ara ile 2-3 kez uygulanır	200- 300	1- 3	Ornamentals, Cut Flowers	200- 300
	Farklı Mısır Ağaçları,Soğan,Karavita,Tahıl Hubday,Ayraz,Yalıt,Çavdar vb.)Baklagiller/tem Bikileri vb.)	Bikilerin 4-5 yaşraklı döneminden hasada kadar 1-2 kez uygulanır	200- 300	-	Cotton, Corn, Sunflower, Soybeans, Canals, Grains (Wheat, Barley, Oat, Rye etc), Pulse, Forage Crops etc.	200- 300
	Yeşil Alanlar	İhtiyaç duyuldukça 2-3 kez uygulanır	200- 300	-	Green Areas	200- 300
TÜRKÇE						
ENGLISH						
RUSSIAN						
SPANISH						
ARABIC						
FARSI						

Asla uygun doz oranını aşmayınız.
Sadece gerekli yerlerde kullanınız.



LİSANS NO : 422
TESCİL NO
PARTİSİ NO
ÜRETİM TARİHİ
SON KULLANMA TARİHİ
NET AĞIRLIK

TAAHHÜT:Piyasaya sunacağımız ürünün içeriği etiket bilgileri ile tescil belgesindeki değerlerin aynı olacağını taahhüt eder, aksinin ispatı halinde 7223 sayılı kanuna göre, hakkımızda yapılacak cezai işlemleri kabul ederiz.*

ÜRETİCİ FIRMA

ODAK TARIM

TİCARET LTD. STİ.

AOSB 1 KISIM MAH. 10. CAD. 2

DÜŞEMEALTI / ANTALYA

TEL: 0 242 322 01 88 Fax: 0 242 313 0527

www.odaktarim.com