

ORGANOMİNERAL ÜRÜNLER
NPK'LI SIVI ORGANOMİNERAL GÜBRE

Plant Feed

9-5-11+ME

UYARILAR:

* Çocuklardan, Evcil Hayvanlardan ve Gıdalardan uzak tutunuz. * Göz, yüz ve deri ile temas ettirmeyiniz, temas ettiğinde, hemen bol su ile yıkayınız, yutmayınız. * Yutulması halinde, doktora başvurunuz. * Gübreleme esnasında, Maske, Eldiven ve Gözlük kullanınız. * Boş ambalajları başka amaçlar için kullanmayınız, imha ediniz. Ürünü kullanmadan önce mutlaka çalkalayınız. * Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.

DEPOLAMA ŞARTLARI:

* Ürün, kendi orijinal ambalajında, serin ve kuru ortamda 0 °C / + 45 °C arasında, depolandığında, fiziksel ve kimyasal özelliklerini 3 yıl korur. * Bu nedenle, Ürünü kendi orijinal ambalajında, kuru ve serin bir yerde, belirtilen sıcaklıklar arasında muhafaza ediniz. * Ürünü, her ne şekilde olursa olsun, Güneş ışığına maruz bırakmayınız.

ÇÖZÜNÜRLÜĞÜ:

Suda, tavsiye edilen konsantrasyonlarda çözünür, hiçbir şekilde çökmez ve kalıntı bırakmaz.

KARIŞILIRLILIK:

Birçok gübre ve zirai ilaç ile karışabilir. Karıştırılmadan önce test edilmesi tavsiye edilir. Kullanmadan önce mutlaka çalkalayınız.

FİRMA BEYANI:

Üretici tarafından, ürünün kullanımı, firmamızın kontrolü dışında olduğundan, hatalı kullanım ve karışımlardan dolayı oluşabilecek olumsuzluklar ile amaç dışı kullanım ve depolamadan doğacak sorunlardan firmamız mesuliyet kabul etmez. Spesifikasyona uygunluğu, sadece, ürünün teslimi sırasında, firma garantisidir altındadır.



GARANTİ EDİLEN İÇERİĞİ

Organik Madde
Toplam Azot (N)
Amonyum Azotu (N)
Nitrat Azotu (N)
Toplam Fosfor Pentaoksit (P₂O₅)
Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P₂O₅)
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K₂O)
Suda Çözünür Demir (Fe)
Suda Çözünür Mangan (Mn)
Suda Çözünür Çinko (Zn)
Maksimum Klor (Cl)
pH

(W/W)

% 19
% 9
% 3.7
% 5.3
% 5
% 11
% 0.02
% 0.02
% 0.02
% 2
4.1-6.1

KULLANILDIĞI BİTKİLER, UYGULAMA ZAMANI ve MİKTARI

ÜRÜN	UYGULAMA DÖNEMİ	UYGULAMA DOZU	
		YAPRAKTAN (100 L/ha)	TOPRAKTAN DAMLAMLA (da)
ELMA, ARMUT, ŞEFTALİ, KAYISI, KIRAZ, VIŞNE, ERİK, NAR, BAĞ, ANTEP FİSTİĞİ, FİNDIK, KIVI, İNCİR	Sürgünler açmaya başladığından itibaren hasada kadar 15-20 gün ara ile uygulanır.	200-250 g	1-3 kg/da
NARANCIYE, ZEYTİN, MUZ	Vejetatif dönemde 15-20 gün ara ile uygulanır.	200-250 g	1-3 kg/da
DOMATES, BİBER, HİYAR, PATLICAN, KAVUN, KARPUZ, KESME ÇİÇEKÇİLİK	Fidelerin sağaltılmasından itibaren 10-15 gün ara ile uygulanır. B10	150-200 g	1-3 kg/da
MERCEMEK, NOHUT, ÇELTİK, ŞEKER PANCARI, TÜTÜN, HUBUBAT	Yetiştirme periyodu boyunca 2 kez yapraktan uygulanır.	150-200 g	-
YER FİSTİĞİ, RAMUK, AYÇİĞEĞİ, MISIR, KANOLA V.B.	Yetiştirme periyodu boyunca 2 kez yapraktan uygulanır.	150-200 g	-
ÇAY, MEYVE FİDANLARI	Yetiştirme periyodu boyunca 10-15 gün ara ile uygulanır.	200-250 g	1-3 kg/da
YEŞİL ALAN BİTKİLERİ	Yetiştirme periyodu boyunca 10-15 gün ara ile uygulanır.	150-200 g	-

LİSANS NO:497

TESCİL NO:

PARTİ/SERİ NO:

ÜRETİM TARİHİ:

SÖN KULLANMA TARİHİ : Üretim Tarihinden İtibaren 3 Yıldır.

Ürünün Garanti Edilen Net Ağırlıkları veya Hacimleri:

Net Ağırlık: 0,25-0,5-1-2-2,5-3-4-5-10-15-18-20-25-30-35-40-50kg

ÜRETİCİ FİRMA

ODAK TARIM
TİC. LTD. ŞTİ.

AOSB 1. Kısım, 10.CAD NO:2, Döşemealtı/ANTALYA

Tel: +90 242 322 01 88

www.odaktarim.com



Odak Tarım

TAAHHÜT:

Piyasaya sunacağımız ürün içeriğinin, Etiketindeki ve Tescil belgesindeki bilgiler ile aynı olacağını taahhüt eder, Aksinin ispatı halinde, 7223 Sayılı kanuna göre, hakkımızda yapılacak cezai işlemi, peşinen kabul ederiz.



ASLA UYGUN DOZ ORANLARINI AŞMAYINIZ!
SADECE GEREKLİ YERLERDE KULLANINIZ!